

ما هي؟	الإصحاح قبل القذف	الاستمجة قتلانة الحيوانات المنوية	الواقي الذكري	الواقي الأنثوي	الحاجز المهبلي / غطاء علق الرحم	موانع الحمل القابلة للتروس تحت الجلد (وسيرة إيمبلون)	حقن نبيون بروتيرا
كيف تقوم بوظيفته؟	لا يتغير كل من الوضعة والحيوان المنوي، وبالتالي لا يمكن حدوث الحمل.	قتل الحيوانات المنوية لأن هذه الاستمجة توضع بداخل المهبلي قبل أن يبلغ القضيب فيه.	يحفظ بالمثل المنوي فلا يمكن دخوله إلى رحم الأنثى، يجب ارتداء الواقي قبل الجماع والتخلص منه بعد الانتهاء.	التهاب المعلقة الحراب الممرضع داخل المهبلي تحول دون وصول الحيوانات المنوية إلى علق الرحم.	تتمتع الحيوان المنوي من الدخول إلى قنوات قلب الرحم. يوضع كبريتات الفضة في الحاجز المهبلي ويمكن وضعه في المهبلي قبل الجماع لفترة تصل إلى ساعيتين.	تتم زرعها في الجزء العلوي من النزاع ويثبت تقريباها لفترة تصل إلى ثلاث سنوات.	هذه البرمونات تمتع خروج البويضات من مبايض الأنثى و/أو تحلل الأبر صمنا على الحيوان المنوي في الدخول إلى قنات قلب
المنزبا	<ul style="list-style-type: none"> نسبه قتلتها في منع الحمل 100% يسمح بتمو العلاقة دون جنس الواقية من خطر الإصابة بالأمراض المنقولة جنسيا STDS/STIS بما فيها مرض متلازمة نقص المناعة البشرية / الإيدز AIDS/HIV 	<ul style="list-style-type: none"> سهل الحصول عليها سهل الاستخدام 	<ul style="list-style-type: none"> سهل الحصول عليه سهل الاستخدام الواقية من خطر الإصابة بالأمراض المنقولة جنسيا STDS/STIS 	<ul style="list-style-type: none"> سهل الحصول عليه لا توجد آثار جانبية على أجهزة الجسم الواقية من خطر الإصابة بالأمراض المنقولة جنسيا STDS/STIS رغمه غير أخر لتهولاه اللين لا يمكن أو لا يرغب أورا لهم استخدام الواقيات الذكورية 	<ul style="list-style-type: none"> يمكن إعادة استخدامه يتمن استخدامه إذا أراد الزوجان الجماع أكثر من مرة واحدة في 24 ساعة - إذا وضع المزيد من الكريم / الجبل القابل للحيوانات المنوية داخل الحاجز المهبلي. 	<ul style="list-style-type: none"> فعالية الجماع لا تتورق الجماع تأثيرها قابل للأمان لا يورق الجماع شهور يمكن تقليب الحقنة الواحدة ثلاثا 	<ul style="list-style-type: none"> لا تبقى من الإصابة بالأمراض المنقولة جنسيا STDS/STIS، وفروس نقص المناعة البشرية HIV لا توصي بها المختبرات يحتفل حدوث مضاعفات عند إزالتها قد تكون أقل فعالية للنساء اللواتي يعالين من زيادة الوزن
من أين يمكنك الحصول عليه	<ul style="list-style-type: none"> بعد دائما خذارك الخاص، قد تحتاج إلى التدريب على كبح الشهوة. 	<ul style="list-style-type: none"> تبيع محتل إذا طالت في المهبلي لفترة أطول من 30-24 ساعة، فيناله، خطر الإصابة بمتلازمة السممة السمية 	<ul style="list-style-type: none"> تبيع محتل قد يساعد تغيير الماركات على الحد من ذلك 	<ul style="list-style-type: none"> لا يوجد 	<ul style="list-style-type: none"> قد تحدث الدورة الشهرية بشكل غير منتظم قد يشيب كما في حبوب منع الحمل 	<ul style="list-style-type: none"> قد يحدث نزيف بشكل غير منتظم قد يشيب كما في حبوب منع الحمل 	<ul style="list-style-type: none"> قد يحدث نزيف بشكل غير منتظم قد يشيب كما في حبوب منع الحمل
التأثير على الجنس	<ul style="list-style-type: none"> قد يمنع بتمو العلاقة دون بعض الضغوط التي يمكن للجنس أن يعيقها 	<ul style="list-style-type: none"> من الصديقات أو محلات البقالة. 	<ul style="list-style-type: none"> من الصديقات أو محلات البقالة، القاعة، عيادات دنرك كرك التي للصححة العامة والآت البيج. 	<ul style="list-style-type: none"> من الصديقات أو محلات البقالة. 	<ul style="list-style-type: none"> يجب تركيبه بواسطة الطبيب في عيادات دنرك كرك التي للصححة العامة أو العيادات الخاصة. 	<ul style="list-style-type: none"> يتم تركيبها وتزورها بواسطة خبير الرعاية الصحية الخاص بك، لا تتوافر في عيادات دنرك كرك كواقي للحماية الخاصة. 	<ul style="list-style-type: none"> يجب وصفه بواسطة الطبيب في عيادات دنرك كرك كواقي للصححة العامة أو العيادات الخاصة.

STDS/STIS (العدوى المنقولة جنسيا) HIV (فروس نقص المناعة البشرية) التي يسبب مرض الإيدز AIDS

حدد خيار تلك بالنسبة لمنع الحمل

الربط (التقديم)	فترات الحورات المنوية	تنظيم الأسرة الطبيعي	الولب (الولب الرحمي)	امسدة لمنع الحمل	الحقنة المجهولة	حبوب منع الحمل	ما هي؟
<ul style="list-style-type: none"> • اجراء طبي يقوم به الطبيب لإزالة حورات الحمل 	<ul style="list-style-type: none"> • مراد كيميائية قاذبة للحورات المنوية وتوضع داخل المهبل قبل الجماع 	<ul style="list-style-type: none"> • طريقة للتبويض وتيرة الإخصاب الطوي عند الأثني 	<ul style="list-style-type: none"> • أداة بلاستيكية صغيرة تحتوي على الحظان أو الحوريات والتي يتم تركيبها في رحم الأثني بواسطة الطبيب 	<ul style="list-style-type: none"> • امسدة توضع على الحظ مرة كل اسبوع لمدة ثلاثة أسابيع وتقوم بإطلاق الهرمونات 	<ul style="list-style-type: none"> • عبارة عن حقنة يتم إدخالها في المهبل لمدة ثلاثة (3) أسابيع وتقوم بإطلاق الهرمونات 	<ul style="list-style-type: none"> • عبارة عن قرص يحتوي على هرمونات تتناولها المرأة يوميا في نفس الموعد 	<ul style="list-style-type: none"> • طريقة العمل
<ul style="list-style-type: none"> • الإباحت - يتم قطع حورات فالرب أو إدخال أنبوب فيها • التكرار - يتم قطع الأنبوب (القناة المثانة المثلي) والتي لا تتمكن الحورات المنوية من الخروج 	<ul style="list-style-type: none"> • تكمل الحورات المنوية لأن هذه المراد الكيميائية توضع داخل المهبل قبل أن تلج القصب فيه. 	<ul style="list-style-type: none"> • يجعل الأثني تتابع بدقة دورات الطمث وإفرازات الحميم الخاصة بالمرحلة فترة الخصوبة وتجنب الجماع خلال تلك الفترة. 	<ul style="list-style-type: none"> • الطريقة مناسبة في معظم الأحيان يساعد على معرفة فترة الخصوبة إذا كان الزوجان يرغبان في حوريات الحمل 	<ul style="list-style-type: none"> • هذه الهرمونات تمنع خروج البويضات من مبايض الأثني و/أو تجعل الأثر صعبا على الحيوان المنوي في السجور إلى حورات فالرب 	<ul style="list-style-type: none"> • هذه الهرمونات تمنع خروج البويضات من مبايض الأثني و/أو تجعل الأثر صعبا على الحيوان المنوي في السجور إلى حورات فالرب 	<ul style="list-style-type: none"> • قد تؤدي إلى طمث أخف وأكثر انتظاما • قد تبقى من الإحصية ببعض أنواع السرطان • لا تعوق الجماع 	<ul style="list-style-type: none"> • المنحنيات أكثر عرضة لحوريات مصاطات عند تناولهم الحبوب • لا تبقى من الإحصية بالأمر لمن المتقولة جنسيا STDS/STIs
<ul style="list-style-type: none"> • تعد هذه الوسيلة دائمة بلا رجعة. يجب أن يكون الزوجان متأكدين تماما من رغبتهم في الإحصية بالأمراض المتقولة جنسيا • لا تبقى من الإحصية بالأمراض المتقولة جنسيا STDS/STIs • فيروس HIV، وفيروس نقص المناعة البشرية HIV 	<ul style="list-style-type: none"> • ليست فعالة بشفال الكاثي عند استخدامها متفرقة. يجب استخدامها مع الواقي الذكري • لا تبقى من الإحصية بالأمراض المتقولة جنسيا STDS/STIs • يجب أن تستغرق الإحصية/الإفراج وقتا كافي تترب. 	<ul style="list-style-type: none"> • يجب أن تأخذ وقتا كافي كل يوم لاستخدام هذه الوسيلة بصورة صحيحة • لا تبقى من الإحصية بالأمراض المتقولة جنسيا STDS/STIs 	<ul style="list-style-type: none"> • لا يوصى به النساء اللاتي لم يتجنبن من قبل • لا تبقى من الإحصية بالأمراض المتقولة جنسيا STDS/STIs • نقص المناعة البشرية HIV 	<ul style="list-style-type: none"> • تهبج محتمل للجلد بسبب اللصقة • يزيد من خطر الإحصية بالمشكلة المناعية والأزمات القلبية • لا تبقى من الإحصية بالأمراض المتقولة جنسيا • نقص المناعة البشرية HIV، وفيروس نقص المناعة البشرية HIV • أقل فعالية للنساء اللاتي يزيد وزنهن عن 90 كيلو 	<ul style="list-style-type: none"> • بعض النساء قد يشعرون بعدم الراحة بصحت إدخال الحقنة في مهبلهن • قد تتراخ الحقنة للخلج • يزيد من خطر الإحصية بالمشكلة المناعية والأزمات القلبية • لا تبقى من الإحصية بالأمراض المتقولة جنسيا STDS/STIs • نقص المناعة البشرية HIV، وفيروس نقص المناعة البشرية HIV 	<ul style="list-style-type: none"> • قد تسبب في حوريات عقان، كتف المزاج، الإفراج أو نزيف مهبلي بين دورات الطمث، وفي حالات نادرة تحدث كحطبات حموية ومشكلات في الكبد/العين. 	<ul style="list-style-type: none"> • الاثر الجائبة
<ul style="list-style-type: none"> • مضاعفات محتملة من العملية 	<ul style="list-style-type: none"> • تهبج محتمل للتكرار أو الأثني- قد يساعد تغيير المراكات على الحد من ذلك 	<ul style="list-style-type: none"> • لا يوجد 	<ul style="list-style-type: none"> • قد يتسبب في الإحصية بالأمراض محمية • قد يسبب طمث غزير وتقلصات 	<ul style="list-style-type: none"> • تهبج محتمل ويصبح داكن اللون أسفل الصقة ميسلمة • طرارة الثدي، نزيف مهبلي، وطمث مبالغ خاصة أثناء أول دورتين بعد الاستخدام 	<ul style="list-style-type: none"> • التهاب المهبل أو الشعور بعدم الراحة فيه • الاثر الحاقية المرتبطة بالهرمونات قليلة، ولكنها قد تشمل الشعور بالصداع، العينان وطرارة الثدي 	<ul style="list-style-type: none"> • قد تسبب في حوريات عقان، كتف المزاج، الإفراج أو نزيف مهبلي بين دورات الطمث، وفي حالات نادرة تحدث كحطبات حموية ومشكلات في الكبد/العين. 	<ul style="list-style-type: none"> • الاثر الجائبة
<ul style="list-style-type: none"> • يجب إبواره بواسطة الطبيب. لا تتوفر في عيادات دائرة الصحة العامة. كرك كارتني للصحة العامة. 	<ul style="list-style-type: none"> • من الصناعات أو محلات النعالة أو عيادات دائرة الصحة العامة، ويشمل: رغبة، اعظية، جيل، أقماع وكريم 	<ul style="list-style-type: none"> • تتوافر أساليب مختلفة في مركز تنظيم الأسرة الطبي com.chicago.hdcocese.Chicago.Arc (org.familyministers) 	<ul style="list-style-type: none"> • يجب وضعه بواسطة الطبيب. استفسر عن ذلك في عيادات دائرة كارتني للصحة العامة أو العيادات الخاصة. 	<ul style="list-style-type: none"> • يجب وصفه بواسطة الطبيب في عيادات دائرة كارتني للصحة العامة أو العيادات الخاصة. 	<ul style="list-style-type: none"> • يجب وصفه بواسطة الطبيب في عيادات دائرة كارتني للصحة العامة أو العيادات الخاصة. 	<ul style="list-style-type: none"> • يجب وصفها بواسطة الطبيب في عيادات دائرة كارتني للصحة العامة أو العيادات الخاصة. 	<ul style="list-style-type: none"> • من أين يمكنك الحصول عليه
<ul style="list-style-type: none"> • لا يؤثر العملية على الرعية أو القدرة الجنسية • بمجرد أن يتم إجراؤها لن تتوقف الجماع 	<ul style="list-style-type: none"> • يستغرق بعض الوقت لإدخالها ويكون أكثر فعالية إذا وضعت داخل المهبل قرب وقت الجماع 	<ul style="list-style-type: none"> • يجب أن يتوقف الجماع أو يتعلم طريقة اخرى أثناء فترة الإخصاب 	<ul style="list-style-type: none"> • لا يعوق الجماع 	<ul style="list-style-type: none"> • لا تعوق الجماع 	<ul style="list-style-type: none"> • لا تعوق الجماع 	<ul style="list-style-type: none"> • لا تعوق الجماع 	<ul style="list-style-type: none"> • التظير على الجماع

حبيب منع الحمل الطرية متوفرة في عيادات تنظيم الأسرة الخاصة بدائرة الصحة العامة. اتصل المرصدة أو الطبيب عن هذا الخيار. يجب تناول الحبوب بعد 72 ساعة من الجماع بدون حمية.

أرقام هواتف المكتب - اتصل كي نحجز موعدا.

الضواحي الشمالية
847-818-2860
TDD 847-818-2023

الضواحي الغربية
708-786-4000
TDD 708-786-4002

الضواحي الجنوبية الغربية
708-974-6160
TDD 708-974-6043

الضواحي الجنوبية
708-232-4500
TDD 708-232-4010

Cook County
Department of Public Health
Cook County Health and Hospitals System



Rev,
09.10.2010