

ما هي؟	الاصحاب قبل القلق	الاستجابة فئاته الحيوانات المنوية	الوراثي الذكري	الوراثي الانثوي	الحاجز المهبل / غطاء علق الرحم	موانع الحمل القابلة للتروس تحت الجلد (وسيرة إيمبلون)	حقن نيبو بروفيرا
كيف تقوم بوظيفته؟	لا يتغير كل من الوضعة والحيوان المنوي، وبالتالي لا يمكن حدوث الحمل.	تقل الحيوانات المنوية لأن هذه الاستجابة توضع بداخل المهبل قبل أن يبلغ القضيب فيه.	يحفظ بالمثل المنوي فلا يمكن دخوله إلى رحم الأنثى، يجب ارتداء الواقي قبل الجماع والتخلص منه بعد الانتهاء.	• نهاية المعلقة للحراب الممرض مع داخل المهبل تحول دون وصول الحيوانات المنوية إلى علق الرحم.	• تمنع الحيوان المنوي من الدخول إلى قنوات قلب. يوضع كبريت قبل فترة تصل إلى ثلاث سنوات.	• يتم زرعها في الجزء العلوي من النزاع ويثبت تقريبا لثلاثة أشهر.	• هذه الهرمونات تمنع خروج البويضات من مبايض الأنثى و/أو تحلل الأبر صغرا على الحيوان المنوي في الدخول إلى قنات قلب.
الانزبا	• نسبة فاعليتها في منع الحمل 100% • يسمح بنمو العلاقة دون جنس الواقية من خطر الإصابة بالأمراض المنقولة جنسيا • STDs/STIs بما فيها مرض متلازمة نقص المناعة البشرية / الإيدز AIDS/HIV	• سهل الحصول عليها • سهل الاستخدام	• سهل الحصول عليه • سهل الاستخدام • الواقية من خطر الإصابة بالأمراض المنقولة جنسيا STDs/STIs	• سهل الحصول عليه • لا توجد آثار جانبية على أجهزة الجسم • الواقية من خطر الإصابة بالأمراض المنقولة جنسيا STDs/STIs • وثمة خطر آخر لتهوية اللين لا يمكن أو لا يرغب أروا لهم استخدام الواقيات الذكرية	• يمكن إعادة استخدامه • يمكن استخدامه إذا أراد الزوجان الجماع أكثر من مرة واحدة في 24 ساعة - إذا وضع المزيد من الكريم / الجبل القابل للحيوانات المنوية داخل الحاجز المهبل.	• لا توصى بها المختبرات • يحتفل حدوث مضاعفات عند إزالتها • قد تكون أقل فاعلية للنساء اللواتي يعانين من زيادة الوزن	• لا تبقى من الإصابة بالأمراض المنقولة جنسيا STDs/STIs، وفرو من نقص المناعة البشرية HIV
العيوب	• يصعب التحكم فيه في كل الأوقات • يتطلب الكثير من الإزادة	• يجب ترك الاستجابة في مكانها لفترة لا تقل عن 6 ساعات بعد الجماع • يجب إخراج الاستجابة خلال 30 ساعة من إدخالها • قد لا تكون فعالة بشكل جيد عند استخدامها بعد الولادة • لا تبقى من الإصابة بالأمراض المنقولة جنسيا STDs/STIs	• قد يتسبب في زيادة الوزن • يحتاج التاكيد من أنه ووضعه داخل المهبل بشكل صحيح	• يحتاج أن يعاد تثبيته في حالة زيادة أو فقدان الوزن إنجاليه • قد يكون من الصعب إنجاليه	• يجب أن يعاد تثبيته في حالة زيادة أو فقدان الوزن إنجاليه • قد يكون من الصعب إنجاليه	• قد تحدث الدورة الشهرية بشكل غير منتظم • قد يتسبب في حدوث آثار جانبية كما في حبوب منع الحمل	• قد يحدث نزيف بشكل غير منتظم • قد يتسبب في حدوث آثار جانبية كما في حبوب منع الحمل
اللائس الجانبيه	• لا يوجد	• تبيع محتفل • إذا طالت في المهبل لفترة أطول من 30-24 ساعة، فيناله، خطر الإصابة بمتلازمة السمكة السمية	• تبيع محتفل للذكور أو الأنثى - قد يساعد تغيير الماركات على الحد من ذلك	• لا يوجد	• قد يشيب في عدى بالمتانة • تبيع محتفل - قد يساعد تغيير الماركات على الحد من ذلك	• قد تحدث الدورة الشهرية بشكل غير منتظم • قد يتسبب في حدوث آثار جانبية كما في حبوب منع الحمل	• قد يحدث نزيف بشكل غير منتظم • قد يتسبب في حدوث آثار جانبية كما في حبوب منع الحمل
التأثير على الجنس	• قد دائما خبزك الخاص، قد تحتاج إلى التعرب على كبح الشهوة.	• يستغرق بعض الوقت لإدخالها قبل الجماع	• يجب أن يتوقف الذكر أو الأنثى قليلا لوضع الواقي الذكري حول القضيب • قد تساعد على بقاء المنوي الذكري متمسكا لفترة أطول • مخصصة للاستخدام مرة واحدة فقط	• يمكن وضعه داخل المهبل قبل الجماع • يسمح للزوجين بحرية التحرك أثناء الجماع • مخصصة للاستخدام مرة واحدة فقط	• يمكن أن يتكرر الجماع إذا وضع المزيد من الكريم/الجبل القابل للحيوانات المنوية بينما الحاجز المهبلي بالداخل، يجب أن يتراكم بالداخل لمدة 6 ساعات بعد الجماع.	• يتم تركيبها وتزورها بواسطة خبير الرعاية الصحية الخاص بك، لا تتوافق في عيادات دائرة كوك كاونتي الخاصة بالصحة العامة أو العيادات الخاصة.	• يجب وصفه بواسطة الطبيب في عيادات دائرة كوك كاونتي الخاصة بالصحة العامة أو العيادات الخاصة.
من أين يمكنك الحصول عليه	• قد يقدمه خبزك الخاص، قد تحتاج إلى التعرب على كبح الشهوة.	• سهل الحصول عليها	• سهل الحصول عليه	• سهل الحصول عليه	• يمكن أن يتكرر الجماع إذا وضع المزيد من الكريم/الجبل القابل للحيوانات المنوية بينما الحاجز المهبلي بالداخل، يجب أن يتراكم بالداخل لمدة 6 ساعات بعد الجماع.	• يمكن أن يتكرر الجماع إذا وضع المزيد من الكريم/الجبل القابل للحيوانات المنوية بينما الحاجز المهبلي بالداخل، يجب أن يتراكم بالداخل لمدة 6 ساعات بعد الجماع.	• يجب وصفه بواسطة الطبيب في عيادات دائرة كوك كاونتي الخاصة بالصحة العامة أو العيادات الخاصة.

العدوى (العدوى المنقولة جنسيا) HIV (فيروس نقص المناعة البشرية) التي يسبب مرض الإيدز (AIDS)



حدد خيار تلك بالنسبة لمنع الحمل

الربط (التقديم)	فترات الحورات الشهرية	تنظيم الأسرة الطبيعي	الولب (الولب الرحمي)	امسطة لمنع الحمل	الحقنة المجهولة	حبوب منع الحمل	ما هي؟
<ul style="list-style-type: none"> • إجراء طبي يقوم به الطبيب لإزالة دهن حورت الحمل 	<ul style="list-style-type: none"> • مراد كيميائية قاذبة للحورات الشهرية وتوضع داخل المهبل قبل الجماع 	<ul style="list-style-type: none"> • طريقة للتبويض وتيرة الإخصاب الطوي عند الأثني 	<ul style="list-style-type: none"> • أداة بلاستيكية صغيرة تحتوي على الحظان أو الهرمونات والتي يتم تركيبها في رحم الأثني بواسطة الطبيب 	<ul style="list-style-type: none"> • امسطة توضع على الحظ مرة كل أسبوع لمدة ثلاثة أسابيع وتقوم بإطلاق الهرمونات 	<ul style="list-style-type: none"> • عبارة عن حقنة يتم إدخالها في المهبل لمدة ثلاثة (3) أسابيع وتقوم بإطلاق الهرمونات 	<ul style="list-style-type: none"> • عبارة عن قرص يحتوي على هرمونات تتناولها المرأة يوميا في نفس الموعد 	<ul style="list-style-type: none"> • طريقة العمل
<ul style="list-style-type: none"> • الإبانت - يتم قطع حورات فالرب أو إدخال أنبوب فيها • التكرز - يتم قطع الأمبر (القناة المثانة المثلي) والتي لا تتمكن الحورات الشهرية من الخروج 	<ul style="list-style-type: none"> • تنقل الحورات الشهرية لأن هذه المراد الكيميائية توضع داخل المهبل قبل أن تلج القصب فيه. 	<ul style="list-style-type: none"> • يجعل الأثني تتابع بدقة دورات الطمث وإفرازات الحميم الخاصة بالمرحلة فترة الخصوبة وتجنب الجماع خلال تلك الفترة. 	<ul style="list-style-type: none"> • الطريقة مناسبة في معظم الأحيان يساعد على معرفة فترة الخصوبة إذا كان الزوجان يرغبان في حورت الحمل 	<ul style="list-style-type: none"> • هذه الهرمونات تمنع خروج البويضات من مبايض الأثني و/أو تجعل الأمبر صمغا على cervix المتورم في الحورت إلى حورات فالرب 	<ul style="list-style-type: none"> • هذه الهرمونات تمنع خروج البويضات من مبايض الأثني و/أو تجعل الأمبر صمغا على cervix المتورم في الحورت إلى حورات فالرب 	<ul style="list-style-type: none"> • هذه الهرمونات تمنع خروج البويضات من مبايض الأثني و/أو تجعل الأمبر صمغا على cervix المتورم في الحورت إلى حورات فالرب 	<ul style="list-style-type: none"> • طريقة العمل
<ul style="list-style-type: none"> • تعد هذه الوسيلة دائمة بلا رجعة. يجب أن يكون الزوجان متأكدين تماما من رغبتهم في الإحباب مستقبلا. • لا تبقى من الإصمبة بالأمر امن المتقولة جنسيا • فيروس STDS/STIs وتيروس HIV تفص المناعة الشهرية HIV 	<ul style="list-style-type: none"> • ليست فعالة بشفال الكاثي عند استخدامها متفرقة. يجب استخدامها مع الواقي الذكرى • لا تبقى من الإصمبة بالأمر امن المتقولة جنسيا STDS/STIs • يجب أن تستغرق الإحباب/الإفراج وقتا كوي تنرب. 	<ul style="list-style-type: none"> • يجب أن تأخذ وقتا كوي كل يوم لاستخدام هذه الوسيلة بصورة صحيحة • لا تبقى من الإصمبة بالأمر امن المتقولة جنسيا STDS/STIs 	<ul style="list-style-type: none"> • لا يوصى به النساء اللاتي لم يتجن من قبل • لا تبقى من الإصمبة بالأمر امن المتقولة جنسيا TDs/STIs • تفص المناعة الشهرية HIV 	<ul style="list-style-type: none"> • تهبج محتمل للجلد بسبب اللصقة • يزيد من خطر الإصمبة بالمشككة المناعية والأزمات القلبية • لا تبقى من الإصمبة بالأمر امن المتقولة جنسيا • تفص المناعة الشهرية HIV • أقل فعالية للنساء اللاتي يزيد وزنهن عن 90 كيلو 	<ul style="list-style-type: none"> • بعض النساء قد يشمرن بعدم الراحة بصحت إدخال الحقنة في مهبلهن • قد تتراخ الحقنة للخلج • يزيد من خطر الإصمبة بالمشككة المناعية والأزمات القلبية • لا تبقى من الإصمبة بالأمر امن المتقولة جنسيا • تفص المناعة الشهرية HIV 	<ul style="list-style-type: none"> • المحننات أكثر عرضة لحورت مصاعف عند تناولهم الحبوب • لا تبقى من الإصمبة بالأمر امن المتقولة جنسيا STDS/STIs 	<ul style="list-style-type: none"> • العيوب
<ul style="list-style-type: none"> • لا يوق الحوام بجمرد أن تفص اثار العملية 	<ul style="list-style-type: none"> • سهل الحصول عليها 	<ul style="list-style-type: none"> • طريقة مناسبة في معظم الأحيان يساعد على معرفة فترة الخصوبة إذا كان الزوجان يرغبان في حورت الحمل 	<ul style="list-style-type: none"> • بمجرد وضعه، فيحتاج إلى أن يتم قصه شهريا بواسطة المستخدم ويتم استخاله كل 5 - 10 سنوات تبعا لوعه • لا يوق الحوام 	<ul style="list-style-type: none"> • تهبج محتمل للجلد بسبب اللصقة • يزيد من خطر الإصمبة بالمشككة المناعية والأزمات القلبية • لا تبقى من الإصمبة بالأمر امن المتقولة جنسيا • تفص المناعة الشهرية HIV 	<ul style="list-style-type: none"> • بعض النساء قد يشمرن بعدم الراحة بصحت إدخال الحقنة في مهبلهن • قد تتراخ الحقنة للخلج • يزيد من خطر الإصمبة بالمشككة المناعية والأزمات القلبية • لا تبقى من الإصمبة بالأمر امن المتقولة جنسيا • تفص المناعة الشهرية HIV 	<ul style="list-style-type: none"> • المحننات أكثر عرضة لحورت مصاعف عند تناولهم الحبوب • لا تبقى من الإصمبة بالأمر امن المتقولة جنسيا STDS/STIs 	<ul style="list-style-type: none"> • العيوب
<ul style="list-style-type: none"> • مضاعفات محتملة من العملية 	<ul style="list-style-type: none"> • تهبج محتمل للتكرز أو الأثني - قد يساعد تغيير المراكك على الحد من ذلك 	<ul style="list-style-type: none"> • لا يوجد 	<ul style="list-style-type: none"> • قد يتسبب في الإصمبة بأمر امن محمية • قد يتسبب طفم غزير وتلفعات 	<ul style="list-style-type: none"> • تهبج محتمل للجلد بسبب اللصقة • يزيد من خطر الإصمبة بالمشككة المناعية والأزمات القلبية • لا تبقى من الإصمبة بالأمر امن المتقولة جنسيا • تفص المناعة الشهرية HIV 	<ul style="list-style-type: none"> • بعض النساء قد يشمرن بعدم الراحة فيه • الأثر الحاقية المرطبة • يتغير موزنات قليلة، ولكنها قد تشمل الشعور بالصمغ، العيان وطراوة اللثي 	<ul style="list-style-type: none"> • قد يتسبب في حورت عفان، تنف المرازج، الإفراج أو نزيف مهبي بين دورات الحنن، وفي حالات نادرة تحدث كحانات حموية ومشكلات في الكلد/العين. 	<ul style="list-style-type: none"> • الأثر الحاقية
<ul style="list-style-type: none"> • يجب إبواره بواسطة الطبيب. لا تتوافر في عيادات دائرة الصحة. كرك كارتني للصحة العامة. 	<ul style="list-style-type: none"> • من الصمببات أو محلات النعالة أو عيادات دائرة الصحة العامة، ويشمل: رغو، أعظية، جيل، أقصاع وكريم 	<ul style="list-style-type: none"> • تتوافر أساليب مختلفة في مركز تنظيم الأسرة الطبي com.chicago.hhdioese Chicago Arc (org.familyministers) 	<ul style="list-style-type: none"> • يجب وضعه بواسطة الطبيب. استفسر عن ذلك في عيادات دائرة كارتني للصحة العامة أو العيادات الخاصة. 	<ul style="list-style-type: none"> • تهبج وصفة بواسطة الطبيب. في عيادات دائرة كرك كارتني للصحة العامة أو العيادات الخاصة. 	<ul style="list-style-type: none"> • يجب وصفة بواسطة الطبيب. في عيادات دائرة كرك كارتني للصحة العامة أو العيادات الخاصة. 	<ul style="list-style-type: none"> • يجب وصفة بواسطة الطبيب. في عيادات دائرة كرك كارتني للصحة العامة أو العيادات الخاصة. 	<ul style="list-style-type: none"> • من أين يمكنك الحصول عليه
<ul style="list-style-type: none"> • لا يؤثر العملية على الرغبة أو القدرة الجنسية • بمجرد أن يتم إجراؤها فلن تتوق الحوام 	<ul style="list-style-type: none"> • يستغرق بعض الوقت لإحبابها ويكون أكثر فعالية إذا وضعت داخل المهبل قرب وقت الجماع 	<ul style="list-style-type: none"> • يجب أن يوق الحوام أو يتم بطرقة اخرى أثناء فترة الإخصاب 	<ul style="list-style-type: none"> • لا يوق الحوام 	<ul style="list-style-type: none"> • لا يوق الحوام 	<ul style="list-style-type: none"> • لا يوق الحوام 	<ul style="list-style-type: none"> • لا يوق الحوام 	<ul style="list-style-type: none"> • التظير على الحوام

حبيب منع الحمل الطرية متوفرة في عيادات تنظيم الأسرة الخاصة بدائرة الصحة العامة. استمل المرصضة أو الطبيب عن هذا الخيار. يجب تناول الحبوب بعد 72 ساعة من الجماع بدون حمية.

أرقام هواتف المكتب - العمل كي تحجز موعدا.

الضواحي الشمالية
847-818-2860
TDD 847-818-2023

الضواحي الغربية
708-786-4000
TDD 708-786-4002

الضواحي الجنوبية الغربية
708-974-6160
TDD 708-974-6043

الضواحي الجنوبية
708-232-4500
TDD 708-232-4010

Cook County
Department of Public Health
Cook County Health and Hospitals System



Rev,
09.10.2010